Renseignements et préconisations patient : Recueil d'urines (nourrisson) pour ECBU, DHL

- Document à caractère confidentiel-

Cette fiche doit être jointe à chaque prélèvement accompagnée de la prescription

Pour les prélèvements qui ne sont pas déposés directement au laboratoire, en cas de tiers payant, merci de joindre une photocopie de l'attestation carte vitale et mutuelle.

PRENEZ SOIN DE SA SANTE EN RÉPONDANT AU QUESTIONNAIRE CI-DESSOUS

Nom ……

Nom de naissance……

Prénom ……

Date de naissance……

Téléphone ……

Adresse ……

Étiquette patient, réservé au laboratoire

Date et heure de recueil ……/……/…… à ……h…… Préleveur : ……

Modalité de recueil :

❑ Laboratoire ❑ Domicile ❑ Cabinet médical ❑ EDS :…… ❑ Service :……

❑ Urinocol (en place 30 minutes max.) ❑ Autres :……

Conservation à 4°C : ❑ Non ❑ Oui

L'enfant présente des signes d'infection urinaire :

❑ fièvre (>38°C)
❑ perte de poids
❑ autres signes :……

L'enfant ne présente pas de signes d'infection urinaire :

❑ **Bilan systématique**
❑ **Bilan d'exploration, suite à :**
  ❑ test à la bandelette positif
  ❑ sang dans les urines
  ❑ urines troubles/malodorantes
❑ **Bilan de contrôle**
  ❑ avant intervention urologique / autre
  ❑ après intervention urologique / autre
  ❑ après traitement antibiotique

L'enfant a des facteurs de risque :

❑ hospitalisation récente
❑ malformation tractus urinaire
❑ autres :……

Traitement antibiotique :

❑ NON ❑ En cours ❑ A venir Date de début de traitement : …… Ou traitement arrêté depuis :……

(Liste des antibiotiques recommandés par la SPLF dans la prise en charge des infections urinaires)

❑ Amoxicilline CLAMOXYL, TOTAPEN
❑ Céfixime OROKEN
❑ Cotrimoxazole BACTRIM, EUSAPRIM
❑ Amoxi + ac clavulanique AUGMENTIN
❑ Ceftriaxone injectable ROCEPHINE
❑ Gentamicine injectable GENTALLINE

❑ Autres antibiotiques :……

Partie à remplir par l'IDE ou le patient :
Heure de transfert :…… Date :……Par :……

Partie à remplir par le laboratoire périphérique :
Transfert sur borate : ❑ Non ❑ Oui
Heure de réception :…… Date :…… Par :…… .. Conforme : ❑ Non ❑ Oui

Modalités de recueil (peut être effectué par les parents) :

- Réaliser l'examen avant toute prise d'antibiotiques (ou arrêtés depuis plus de 48 heures), sauf avis contraire du médecin.

- Faire boire l'enfant avant de venir au laboratoire ou de poser la poche.

- Se laver les mains puis nettoyer soigneusement la peau du bébé avec une solution micellaire afin qu'elle soit propre. Rincer à l'eau. Désinfecter avec une lingette antiseptique. Bien sécher par tamponnement.

- Sortir la poche stérile de son emballage, retirer la protection qui couvre la partie adhésive et appliquer en massant pour obtenir une bonne adhérence.

- Laisser en place **trente minutes maximum, de préférence.**

- Pour le retrait de la poche, la détacher doucement en tirant sur un coin. Pour assurer l'étanchéité, replier la partie adhésive face contre face et placer la poche dans le flacon fourni par le laboratoire.
Attention le recueil ne doit pas être souillé par des selles.

- Noter sur l'échantillon l'**identité du patient (nom, prénom, date de naissance)**.

- Acheminer les urines au laboratoire **dans les 2 heures maximum** à **température ambiante**.

En cas d'impossibilité, les conserver au **réfrigérateur** (**délai maximum: 24 heures**).

Étapes réalisées par l'infirmier(e) : modalités de transfert dans les tubes de transport

***NB** : à la demande du laboratoire, certains patients peuvent-être amenés à réaliser cette étape*

Ordre des tubes



Tubes BD

☞ **ECBU : prendre systématiquement les 2 tubes BD**
Transférer le **tube beige en premier et le tube vert en second**

☞ **Si une recherche isolée de cristaux et/ou DLH est prescrite :**
Prendre un tube beige uniquement



Agiter les tubes par 5 retournements.
Replacer l'étiquette autocollante blanche du flacon.
Noter sur les tubes l'identité du patient (nom, prénom, date de naissance).
Mettre le flacon et les tubes dans le sachet.
Apporter le sachet au laboratoire rapidement (délai de conservation à température ambiante avant analyse : 48 heures)

Recommandations Rémic